

Aspects diagnostiques et thérapeutiques des hyperparathyroïdies primaires : une série de 15 cas.

Dr H. EL JADIA, Dr AA. GUERBOUBA, Dr A. MEFTAHA, Dr A. MOUMENA, Dr K. RIFAIA, Dr S. SELLAYA, Dr S. ECH-CHERIF ELKETTANIA, Dr A. ELMASMOUDI, Dr S. ELMOUSSAOUIA, Pr G. BELMEJDOUBA

Service d'Endocrinologie-Diabétologie, Hôpital Militaire d'Instruction Mohammed V, Rabat, Maroc

Objectif :


Etudier les caractéristiques cliniques, diagnostiques et thérapeutiques de l'hyperparathyroïdie primitive (HPP).

Matériel d'étude :

Une étude rétrospective de 15 cas d'HPP hospitalisés au service d'Endocrinologie de l'Hôpital militaire Mohamed V Rabat-Maroc

Résultats :


Notre série comporte un homme et 14 femmes. la médiane d'âge est de 54 ans [51–61]. l'HPP est découverte suite à des signes ostéo-articulaires chez 9 patients, signes généraux chez 3 patients, épigastralgie chez 1 patient, syndrome polyuropolydypsique chez 1 patient. La découverte fortuite d'une hypercalcémie chez 5 patients.



Fréquence des différents symptômes cliniques de l'HPT1

La calcémie corrigée médiane est de 113 mg/ml [107,114], la parathormonémie médiane est de 170 pg/ml [127,270], la calciurie de 24h médiane 274,5 [139,5 ; 510,75]

Tous nos patients ont bénéficié d'une échographie cervicale et d'une scintigraphie au MIBI, la TDM cervicale à été réalisée chez 10 patients.




sensibilité des examens de localisation dans le diagnostic d'HPT1

Le retentissement de l'HPP retrouve : une ostéopénie (6 patients), une ostéoporose (6 patients) et une insuffisance rénale (2 patients)


11 patients ont subi un traitement chirurgical (cervicotomie classique), 4 patients ont été mis sous traitement médical.

Le type histologique le plus fréquent est l'adénome parathyroïdien unique (10 patients), un cas d'adénomes parathyroïdiens multiples, un cas d'hyperplasie parathyroïdienne, un cas d'adénocarcinome et un cas d'adénome parathyroïdien ectopique intra médiastinal.



Fréquence des types histologiques.

Un seul cas rentre dans le cadre d'une néoplasie endocrinienne multiple 1



Répartition des formes cliniques d'HPT1

Discussion :

Notre étude :

- confirme la prédominance féminine de l'HPP
- montre l'intérêt du dépistage des formes asymptomatiques
- souligne l'absence de la parathyroïdectomie mini-invasive, qui prend une place dans la prise en charge de l'HPP.