

Diabète et productivité: quel lien?

ElGuedri S^a, Kalboussi H^b, Mrizek N^b, Laouani Kechrid C^c.

a:Hopital Sahloul, Sousse; b:CHU Farhat Hached, Sousse; c: CHU Sahloul, Sousse.

Introduction: Le diabète sucré est la pathologie la plus fréquente en milieu du travail. Les employés diabétiques sont confrontés à plusieurs risques entravant leurs activités professionnelles et amputant leur productivité.

But de l'étude: Etudier la prévalence du diabète parmi les consultants du service de Médecine du Travail du CHU Farhat Hached de Sousse, ainsi que son impact sur l'activité professionnelle en terme de productivité.

Matériels et méthodes: Il s'agit d'une étude épidémiologique descriptive rétrospective réalisée au Service de Médecine du Travail du CHU Farhat Hached de Sousse portant sur tous les consultants diabétiques durant la période allant du 1^{er} Janvier 2008 jusqu'au 31 Décembre 2012 basée sur une fiche synoptique.

Résultats:

- 101 patients diabétiques ont été recensés avec prédominance masculine.
- L'âge moyen était de $51,16 \pm 6,4$ ans.
- Type de diabète:




Figure n° 1: Répartition de la population d'étude en fonction du type de diabète

- La productivité était gravement touchée avec un rendement diminué à cause de l'incapacité attribuable au diabète .
- L'absentéisme a été noté chez 55,4% des diabétiques.
- Les accidents du travail liés à des épisodes d'hypoglycémie étaient notés chez 8,9% des cas.

L'instabilité professionnelle:

Tableau N° 1: Répartition de la population d'étude en fonction de type d'instabilité professionnelle

Type d'instabilité professionnelle	Pourcentage
Reclassement professionnel	4%
Une invalidité	14,9%
La mise à la retraite pour usure prématurée de l'organisme	10%

Discussion: Notre étude met en évidence l'effet du diabète sur la baisse de la productivité des employés diabétiques. Ces constatations nous incitent à appuyer la demande de mise en place des moyens de prévention efficace et un dépistage précoce du diabète.

Conclusion: Le diabète est la maladie chronique la plus fréquente chez les travailleurs. Son dépistage et sa prise en charge doivent être précoces afin de prévenir son retentissement professionnel.