

Evaluation de la qualité de vie chez les patients suivis pour carcinome différencié de la thyroïde

NE. Haraj1 S. El Aziz1 , H Bourj2 , S. Nani2, A. Chadli1

1) Service d'endocrinologie. CHU Ibn Rochd. Faculté de médecine et de pharmacie. Université Hassan II, Casablanca
2) Service d'épidémiologie. Faculté de médecine et de pharmacie. Université Hassan II, Casablanca, MAROC

INTRODUCTION

✓ Le cancer de la thyroïde est un cancer souvent de bon pronostic, mais qui peut avoir un retentissement sur la qualité de vie des patients.

✓ L'objectif de l'étude est d'évaluer la qualité de vie chez les patients suivis pour carcinome différencié de la thyroïde et rechercher les facteurs associés.

PATIENTS ET METHODE

✓ Etude transversale observationnelle avec un groupe de comparaison menée au service d'endocrinologie du CHU Ibn Rochd entre Octobre 2013 et Février 2015.

✓ L'étude a inclut dans le groupe malade, les patients adultes suivis pour carcinome différencié de la thyroïde et dans le groupe témoin des sujets sains du même âge. La qualité de vie a été évaluée par 3 questionnaires validés en arabe : SF36, HAMILTON pour l'anxiété et HAMILTON pour la dépression.


✓ Analyse des données a été faite par le logiciel SPSS.16

RESULTATS


✓ Au total, on était inclus dans l'étude 124 patients suivis pour cancer de la thyroïde et 124 contrôles (Sujets sains)

	Groupe cancer thyroïde (n= 124)	Groupe contrôle (n=124)
Age	45,31 ± 12,5	44,25 ± 12,5
Sexe	94,4% F / 5,6% H	94,4% F / 5,6% H
Antécédents		
Diabète	3,2%	4%
HTA	1,6%	0,8%
Tabac	0,8%	0,8%
ATCD familiaux	5,6%	2,4%
Autres	5,6%	0%
Profession		
Oui	10,5%	10,5%
Non	89,5 %	89,5 %
Statut marital		
Célibataire	22,6%	21%
Marié	72,6%	75,8%
Divorcé	2,4%	2,4%
Veuf	2,4%	0,8%

LES CARACTERISTIQUES DES PATIENTS DE LA COHORTE




SCORE HAMILTON DEPRESSION DANS LE GROUPE MALADE



SCORE HAMILTON ANXIÉTÉ DANS LE GROUPE MALADE

	Groupe cancer Thyroïde	Groupe Contrôle	p
Moy HAM-D	8,45 ± 4,2222	6,10 ± 2,928	p < 0,01
Moy HAM-A	13,68 ± 6,2333	8,42 ± 4,666	p < 0,01

COMPARAISON DES HAMILTONS DANS LES DEUX GROUPES



COMPARAISON DES PARAMÈTRES DE SF36 DANS LES 2 GROUPES

✓ L'étude analytique a montré que les paramètres ayant une influence significative sur la qualité de vie sont le microcarcinome, la multifocalité, la présence de métastase, le curage ganglionnaire l'irathérapie et sa dose.

✓ L'âge, le sexe, la profession, le statut marital le tau de TSHus, la présence d'hypoparathyroïdie, le type de chirurgie, le curage ganglionnaire n'ont pas de retentissement statistiquement significatif sur la qualité de vie

CONCLUSION

■ La prise en charge psychologique des patients avec cancer de la thyroïde, un point essentiel à ne pas omettre surtout en présence de facteurs de risque altérant la qualité de vie.