

Le suivi des cancers différenciés de la thyroïde au CHU de Casablanca : A propos de 355 patient

NE. Haraj¹ S. El Aziz¹ , K. Zine² , S. Nani², A. Chadli¹

1) Service d'endocrinologie. CHU Ibn Rochd. Faculté de médecine et de pharmacie. Université Hassan II, Casablanca

2) Service d'épidémiologie. Faculté de médecine et de pharmacie. Université Hassan II, Casablanca, MAROC

INTRODUCTION

✓Le cancer de la thyroïde est le plus fréquent des cancers des glandes endocrines. Son pronostic est souvent favorable.

✓L'objectif de l'étude est d'étudier les caractéristiques des patients suivis pour cancer différencié de la thyroïde, évaluer le taux de récurrences et les facteurs de mauvais pronostic.

PATIENTS ET METHODE

✓Etude rétrospective de 355 dossiers de patients suivis pour cancer différenciés de la thyroïde au service d'endocrinologie du CHU IBN ROCHD entre 1986-2014.

✓**La variable principale** : La **récidive tumorale** , recherchée par l'examen clinique de nos patients, le dosage de la thyroglobuline et des anticorps anti-thyroglobuline, l'échographie cervicale et parfois par le balayage corps entier a l'iode 131 et/ ou par un scanner.

✓Les **facteurs suivants ont été analysés** chez les patients ayant eu une récurrence tumorale et ont été comparé aux patients sans récurrence : Le profil clinique : âge et sexe, le profil histologique, la présence d'adénopathie métastatique au diagnostic, la multifocalité et l'effraction capsulaire.

✓Chez les patients ayant eu une récurrence, nous avons étudié le **délai d'apparition** ainsi que la **localisation de cette récurrence**


✓L'analyse des données a été faite par le logiciel SPSS.16

RESULTATS


| Caractéristiques | Chiffres |
|-------------------|---|
| Age moyen | 44.06 ± 12.17 |
| Sexe | Prédominance féminine 93,3 % |
| Type de chirurgie | Thyroïdectomie totale:64% Loboisthmectomie+totalisation: 33.7% Loboisthmectomie:1.3% |
| Irathérapie | 71,2 % |

LES CARACTERISTIQUES DES PATIENTS DE LA COHORTE


TYPE HISTOLOGIQUE



CLASSIFICATION TNM



EVOLUTION TG ET AC anti TG



✓Taux des récurrences : 6,76 %

✓Un délai moyen de survenue de 28,54 mois

✓Récurrence locorégionale dans 89,7 % des cas

| | Récidive | Non récidive | p |
|-----------------------------|----------|--------------|---------|
| Age | | | |
| > 45 ans | 63,2 | 47,9 | P= 0,06 |
| < 45 ans | 36,8 | 52,1 | |
| Sexe masculin | 5,3 | 4,2 | p= 0,57 |
| Multifocalité | 38,5 | 24,1 | p= 0,32 |
| Effraction capsulaire | 38,9 | 15,1 | P= 0,17 |
| Extension extrathyroïdienne | 93,5 | 6,5 | p< 0,01 |

LES FACTEURS PRONOSTIC

CONCLUSION

■Le cancer différencié de la thyroïde reste un cancer de bon pronostic les récurrences sont rares et généralement locorégionales

■Un suivi régulier permet un diagnostic précoce des récurrences et ainsi une prise en charge adéquate